

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



ARTHROSE COXARTHROSE- GONARTHROSE

DR A.BOUKABOUS
SERVICE RHUMATOLOGIE
CHU BENI MESSOUS

1)-INTRODUCTION

- L'arthrose est **une affection articulaire chronique** caractérisée par une dégradation du cartilage associée à des remaniements de l'os sous-chondral et des phénomènes limités d'inflammation synoviale.
- Elle peut entraîner une douleur, typiquement mécanique, un enraidissement articulaire et un handicap fonctionnel


2/-épidémiologie :

- L'arthrose est un problème majeur de santé publique,
- C'est la plus fréquente des affections rhumatologiques
- La gonarthrose est, après l'arthrose digitale, la localisation périphérique la plus fréquente. Parmi les sujets de plus de 65 ans, 30 % ont des signes radiologiques de gonarthrose, symptomatique dans la moitié des cas.
- La coxarthrose : 5%

3/- physiopathologie:


- Elle fait intervenir **des phénomènes constitutionnels** (âge, sexe, obésité, hérédité), **des facteurs mécaniques locaux** (déformations, séquelles traumatiques, dysplasie de hanche, ménisectomie, etc.) et **des altérations biochimiques du cartilage, de la synoviale et du liquide articulaire.**

- Les 3 phases du processus arthrosique sont :
 - Une dégradation de la matrice cartilagineuse
 - Une réaction inflammatoire de la membrane synoviale, avec souvent un épanchement articulaire
 - Réaction de l'os sous-chondral avec prolifération d'os néo-formé:
L'ostéophyte(formation hypertrophique)
- C'est donc une maladie de l'articulation et pas seulement une maladie du cartilage .



4/- COXARTHROSE

A)- CLINIQUE:

- **La douleurs mécaniques** irradiant de l'aîne a la cuisse jusqu'au genou. d'aggravation lente et progressive, **accrues par la marche , la station assise prolongée, l'accroupissement**, la montée d'escaliers, avec gêne pour lacer ses chaussures , se lever d'un siège ou sortir de voiture, **calmées par le repos**.
- le siège des douleurs peut égarer (fesse, trochanter, genou)
 évoquer une coxarthrose en cas de douleurs isolées du genou (**formes trompeuses**)
- **La raideur articulaire** fréquente a la marche et bref derouillage matinal.
- **Réduction du périmètre de marche** avec boiterie d'esquive, évocatrice.


L'examen clinique doit être comparatif a la recherche:

- **D'une Limitation douloureuse des mobilités** de la hanche, de l'extension d'abord ,puis de la flexion croisée, de la rotation interne et de l'abduction.
alors que L'amplitude des mouvements actifs et passifs en flexion est longtemps conservée.
- **atrophie musculaire**(quadricipitale, fessière)
fréquente

B)-RADIOLOGIE:

- Il faut demander des clichés du **bassin de face en charge**, ainsi le **faux profil de Lequesne** mais vrai profil de hanche).
- Ils permettent de rechercher **les signes cardinaux radiographiques de l'arthrose**, et la réalisation de **la coxométrie** qui met en évidence d'éventuels vices architecturaux (dysplasie coxo-fémorale)



- Ⓐ Pincement articulaire supéro-externe
- Ⓑ Ostéocondensation sous-chondrale
- Ⓒ Géodes sous-chondrales
- Ⓓ ostéophytose
 - ① cotyloïdienne
 - ② péricapitale
 - ③ cervicale inférieure
 - ④ sous-capitale
 - ⑤ de l'arrière fond du cotyle
 - ⑥ périfovéale




Coxométrie. A) hanche de face

B) faux profil de lequesne

Angle VCE : couverture
externe de la tête
($N > 25^\circ$).
Angle HTE : obliquité du
toit du cotyle ($N < 10^\circ$).
Angle CC'D : céphalo-
cervico-diaphysaire
($N < 135^\circ$).
Angle VCA : couverture
antérieure de la tête
($N > 25^\circ$).
V : verticale
H : horizontale
C : centre de la tête
fémorale
D : axe de la diaphyse
fémorale
E : point externe du toit
du cotyle
T : point interne du toit
du cotyle
A : point antérieur du toit
du cotyle



Coxarthrose polaire superieure



C)- DIAGNOSTIC POSITIF:

CRITÈRES DE L'ACR POUR LA COXARTHROSE

La présence de 3 des 4 critères :

- *Sujet > 50 ans*
- *Douleurs mécaniques de hanche*
- *Osteophytose ou pincement de l'interligne*
- *VS < 20 mm*

D)-ETIOLOGIE:

- **Coxarthrose primitive (40% des cas):**

Uni ou bilatérale, vers 60 – 70 ans , plus la femme que l'homme,
obèse ou en surcharge pondérale

- **Coxarthrose secondaire (60 % des cas)**

- chez une femme plus jeune
- en cas d'antécédants favorisant l'incongruence des surfaces articulaires :

- **dysplasie congénitale articulaire luxante(40%) ou protrusive(10%)**
- **dysplasie congénitale osseuse poly-épiphysaire ou spondylo-épiphysaire**
- **Coxopathie traumatique:** fracture, luxation de l'extrémité supérieure du fémur; choc du tableau de bord; traumatismes professionnels ou sportifs.
- **Coxite** infectieuse, inflammatoire(PR,SPA) ou microcristalline(CCA).
- **Osteonecrose aseptique de la tête fémorale .**

- **Osteochondrite de l'enfant** (maladie de legg-perthes-calvé = coxa plana)
- **Epiphysiolyse de l'enfant** (coxa rétrorsa et coxa vara)
- **Coxopathie pagétique ; maladie de forestier.**
- **Osteochondromatose synoviale ; synovite villonodulaire.**

E)- EVOLUTION:

- bilatéralisation fréquente, surtout si forme secondaire
- aggravation fréquente avec nécessité de pose d'une prothèse totale de hanche dans un délai de 10 ans dans 90% cas
- aggravation rapide dans le cadre d'une poussée aiguë de chondrolyse et parfois d'arthrose destructrice rapide

F)-TRAITEMENT:

- **MESURES GENERALE , REEDUCATION ++**
 - **économie articulaire:** éviter de marcher lors des périodes très douloureuses, éviter la station debout prolongée, le port de charge lourde, port d'une canne du côté sain, repos avec hanches en extension, perte de poids ++
 - **activité physique:** marche et vélo en dehors des poussées
 - **rééducation douce,** de préférence en piscine pour préserver la mobilité articulaire, la trophicité musculaire et prévenir les attitudes vicieuses (déformation en flessum)

• TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ++

- **Antalgiques simples** à la demande et au long cours, selon l'intensité des douleurs, respecter le principe des paliers
- **Anti-inflammatoires non stéroïdiens** lors des poussées en cure de durée limitée (prescription de 8 à 15 jours)
- **Les AASAL**(piascledine, glucosamine, chondroïtine sulfate...): rémanence, épargne d'AINS.
- **Les infiltrations** sont peu utilisées au niveau de la hanche

- évaluation nécessaire de l'efficacité des médicaments grâce à des critères reproductibles,
- simples (périmètre de marche) ou
- plus complets, comme l' **indice algofonctionnel de Lequesne**

Douleur ou gêne	La nuit	Non	0
		Seulement en remuant ou selon la posture	1
		Même immobile	2
	Lors du dérouillage matinal	Moins d'une minute	0
		De 1 à 15 minutes	1
		Plus de 15 minutes	2
	Lors de la station debout	Non	0
		Oui	1
	Lorsque vous marchez	Non	0
		Seulement après une certaine distance	1
Très rapidement de façon croissante		2	
Votre hanche vous gêne-t-elle si vous restez assis longtemps	Non	0	
	Oui	1	
Périmètre de marche maximale	Aucune limitation		0
	Limité mais supérieur à 1 km		1
	Environ 1 km soit 15 minutes		2
	500 à 900 m		3
	300 à 500 m		4
	100 à 300 m		5
	Moins de 100 m		6
	Une canne ou une béquille nécessaire		+1
	Deux cannes ou béquilles nécessaires		+2
Difficultés dans la vie quotidienne	Pas de difficulté = 0	Mettre ses chaussettes par devant	0 à 2
	Possible avec une petite difficulté = 0,5	Ramasser un objet à terre	0 à 2
	Possible mais difficilement = 1	Monter ou descendre un étage	0 à 2
	Possible mais très difficilement = 1,5	Sortir d'une voiture ou d'un fauteuil profond	0 à 2
	Impossible = 2		
Total			
Résultats: - 0 à 4 points : handicap modeste - 5 6 7 points : handicap moyen - 8 9 10 points : handicap important - 11 12 13 points : handicap très important - 14 points et plus : handicap extrême insupportable L'indication chirurgicale est portée à partir de 10 points environ			

Coxarthrose: indice algofonctionnel de Lequesne

TRAITEMENT CHIRURGICALE

1)-Traitement chirurgical preventif

- Traitement d'une dysplasie coxo-fémorale chez le sujet jeune
 - Butée osseuse en cas d'insuffisance cotyloïdienne pure
 - Ostéotomie fémorale de varisation (**pauwels**), en cas de coxa valga .
 - Ostéotomie du bassin (**Chiari**), en cas de subluxation de la tête fémorale.
- Traitement orthopédique en cas d'ostéochondrite ou d'épiphyseolyse
- Ablation de corps étrangers articulaires en cas d'ostéochondromatose.
- **N.B:** le traitement chirurgical préventif ne peut être envisagé qu'en cas d'**arthrose peu évolué , sans altération majeure de l'interligne**

2)- Prothèse de hanche:

- Coxarthrose supero-externe, souvent mal tolérée: prothèse en 10 ans.
- Coxarthrose polaire interne, souvent bien tolérée: moins souvent opérée
- Coxarthrose destructrice rapide : prothèse en 2 à 3 ans
- Les complications postopératoires (rares) doivent être prévenues.
- Le délai de reprise de l'appui dépend de la technique (avec ou sans trochantérotomie)
- Sa durée de vie est satisfaisante(10% de réintervention à 15 ans).

G)- CONCLUSION:

- ☐ la coxarthrose est la plus fréquente affection de la hanche et on la reconnaît sur la radiographie simple
- ☐ la liste des facteurs étiologiques doit être systématiquement exploitée devant toute coxarthrose car dans la moitié des cas elle est secondaire à un vice architectural ou une autre atteinte coxo-fémorale.
- ☐ le pronostic est d'autant plus favorable que le pincement de l'interligne s'accroît lentement
- ☐ le traitement est d'abord médical puis chirurgical (si mauvaise tolérance) dans la forme primitive.
La chirurgie préventive a une place importante dans les formes secondaires.

5)- GONARTHROSE

A)-INTRODUCTION:

- C'est la première cause de gonalgies mécaniques après 50 ans et la plus fréquente des arthroses des membres
- **Le gonarthrose** est définie par l'ACR par la présence de 3 des 4 critères :
- **Age > 50 ans**
- **Douleurs mécaniques du genou**
- **Osteophyte ou pincement de l'interligne fémoro-tibial ou fémoro-patellaire**
- **VS < 20 mm**

B)- CLINIQUE:

- **Douleurs mécaniques** d'aggravation lente et progressive, **aggravées par la marche calmées par le repos**
- Sensation d'instabilité, de dérobements, de craquements
- **Réduction du périmètre de marche+/- boiterie** (flessum du genou).
- L'évolution parfois émaillée de poussées inflammatoires (**épanchement**) et d'épisodes de blocage(liés a des corps étranger intra-articulaires)

- L'examen **bilatéral et comparatif** retrouve une limitation douloureuse de la flexion du genou et distingue gonarthrose fémoro-tibiale et gonarthrose fémoro-patellaire.

• Syndrome fémoro-tibial=gonarthrose fémoro-tibiale:

- Douleurs **latérales**, lors de la marche sur un terrain **plat ou accidenté**
- Douleurs a la palpation de l'interligne fémoro-tibial (interne ou externe)
- Rechercher un trouble statique:
 - le genu varum (o) favorise la gonarthrose fémoro- tibiale interne**
 - le genu valgum(x) favorise la gonarthrose fémoro-tibiale externe**

● Syndrome rotulien=gonarthrose fémoro-patellaire:

- Douleurs antérieures a la montée et, surtout a la descente des escaliers, en station a genou, accroupie ou assise prolongée(**SIGNE DU CINEMA**).
- douleurs a l'extension contrariée du genou, a la percussion de la rotule, au toucher rotulien, avec **SIGNE DU RABOT**
- **REFLEXE: une ponction du genou est nécessaire en cas d'épanchement**

C)- BIOLOGIE:

- Absence de syndrome inflammatoire biologique
- Dans la gonarthrose le liquide articulaire est **mécanique** : visqueux, **pauvre en cellules**(< 1000 **elements/mm³**) , pauvre en protéines et riche en acide hyaluronique , même dans les poussées dites « inflammatoires » de l'arthrose.


D)- RADIOLOGIE:

- Les radiographies a demander dans l'arthrose du genou :
- Deux genoux en charge de face et de profil
- Un cliché axial (incidence fémoro-patellaire)

- Un **pincement de l'interligne articulaire** localisé dans la zone de pression principale de la jointure.
- L'existence d'**ostéophytes** qui élargissent les contours articulaires.
- Une **condensation de l'os sous-chondral** (situé sous le cartilage) dans la région du pincement articulaire.
- Des **géodes** qui sont inconstantes et siègent au sein de la condensation (aspect de zones arrondies, grises dans la condensation).
- A un stade tardif, une **érosion** de l'os sous-chondral localisée dans la zone de pression ou le cartilage a disparu.



Absence d'arthrose
Pas de pincement articulaire




Arthrose partielle
Pincement interne moyen
fémoro-tibial



Arthrose complète
Pincement Interne complet

..





E)-ETIOLOGIE:

GONARTHROSE PRIMITIVE (50% des cas):

- Chez une femme de 50 a 60 ans, obèse +++
- Souvent bilatérale mais asymétrique, associant fréquemment une gonarthrose femoro-tibiale et une gonarthrose fémoro-patellaire.

GONARTHROSE SECONDAIRE(50% des cas):

- Anomalie des axes jambiers en varus, valgus, recurvatum ou flessum.
- Arthrite infectieuse, inflammatoire ou microcristalline.
- Lésion méniscale, ménisectomie, ostéochondromatose
- Osteonécrose du condyle interne, ostéochondrite.
- Traumatisme professionnel ou sportif: fracture ou luxation.

F)- TRAITEMENT:

Education Thérapeutique-Hygiène de vie:

- Réduction pondérale en cas de surcharge
- Economie articulaire
- Activité physique régulière en dehors des poussées

Traitement symptomatique par voie générale:

- Traitement antalgique de niveau 1 ou 2 de l'OMS
 - En cas de douleurs modérées, surtout chez le sujet âgé: Paracétamol seul(500 mg a 1 gr par prise, sans dépasser 4 gr / jour)+/- codeine ou tramadol
 - Préventivement ou a la demande , avant l'effort
- Traitement anti-inflammatoire non stéroïdien

- En cas de poussée aigue, douloureuse, inflammatoire ou exsudative.
- En privilégiant les AINS a demi-vie courte a dose minimale efficace notamment chez le sujet âgé.
- En association avec un IPP chez le sujet âgé > 65 ans ou a risque d'ulcère.

Traitement anti-arthrosique symptomatique d'action lente:

- Ils ont des effets favorables sur les douleurs, l'index algo-fonctionnelet la consommation d'AINS et une bonne tolérance.
- Ils sont préconisés a un stade peu évolué d'arthrose, en continu ou séquentiellement , pendant 3 a 6 mois(chondroïtine sulfate, glucosamine sulfate, insaponifiables d'avocat et de soja

- Leurs effets retardé de 1 a 2 mois
- Ils ont un effet rémanent de quelques mois a l'arrêt du traitement

Infiltrations cortisoniques:

- Elles sont utilisées dans les poussées inflammatoire et exudative d'arthrose(Altim, diprostène, hydrocortancyl)
- Leurs nombre ne doit pas dépasser 3 /an, envisagé a court et moyen terme(<6 mois)

Injections d'acide hyaluronique:

- **La viscosupplementation** a raison de 3 injection a 1 semaine d'intervalle

Lavage Articulaire : il serait interessant en cas de gonarthrose

Traitement Chirurgical:

- ❑ osteotomie tibiale de valgisation en cas de genu varum ou de verisation
- ❑ Section de l'aileron rotulien externe et transposition De la tubérosité tibiale antérieure en cas de syndrome d'hyperpression externe de la rotule.
- ❑ Le traitement conservateur ne peut être envisagé qu'en **cas d'arthrose peu évoluée, sans altération majeure de l'interligne**

PROTHESE DU GENOU:

- L'indication de la prothèse, est portée sur **des critères cliniques** et non radiologiques, **un index de lequesne > 12 est une bonne indication a la chirurgie dans la gonarthrose et coxarthrose**
- Gonarthrose fémoro-tibiale, souvent mal tolérée: en 10 ans
- Gonarthrose destructrice rapide en 2 a 3 ans



G)- CONCLUSION:

- La gonarthrose est la plus fréquente des pathologies mécaniques du genou
- Un examen clinique simple, et les radiographies standards suffise pour porter le diagnostic
- La prise en charge associe des modalités thérapeutique pharmacologique et non pharmacologique
- L'indice de lequesne > 12 est une indication chirurgicale.